

Upotreba

Novalac 3 napitak na bazi mlijeka/mljeko nakon dojenja s dodanim vitaminima i mineralima namijenjen maloj djeci primjeren je za posebne prehrabne potrebe za djecu od 1. do 3. godine. Pripremljen obrok jedna bočica napitka Novalac 3 sadrži kalcij i vitamin D (potrebni za normalan rast i razvoj kostiju u djece), željezo (doprinosi normalnom kognitivnom razvoju djece) i jod (doprinosi normalnom rastu djece). Novalac 3 je izvor vitamina A, B1, B2, C, D i biotina te je bogat vitaminima B12 i K1. Novalac 3 primjeren je za nastavak hranjenja nakon upotrebe Novalaca 2 ili neke druge prijelazne mliječne hrane. Ima dobar okus vanilije.

Doziranje

Vašem djetetu možete dati topao (< 37°C) ili hladan napitak Novalac 3, ili ga upotrijebiti i za pripremu dječjih žitarica i ostalih obroka kao dio uravnotežene prehrane. Jedna limenka od 400 g dovoljna je za pripremu 11 obroka. Priprema u bočici: Za svakih 30 ml vode dodajte jednu mjericu Novalaca 3. Jedna mjerica sadrži 4,5 g praha. Za 100 ml obroka uspite u bočicu 3 poravnate mjerice praha (15 g). Priprema u čaši: U 240 ml vode dodajte 8 mjerica Novalaca 3.

Uvijek pripremite svježi obrok.
Čuvajte na suhom i hladnom mjestu, zaštićeno od svjetla.
Proizvod je najbolje upotrijebiti do datuma otisnutog na dnu limenke.
Nakon prvog otvaranja limenke sadržaj upotrijebite u roku od 3 tjedna.
Nakon svake upotrebe limenku dobro zatvorite.
Ne čuvajte nepopijeni obrok. Ostatak bacite. Pakirano u kontroliranoj atmosferi.

Sjedište poduzeća: UP Medi-Europa SA, Švicarska.
Kontakt za Hrvatsku: Medis Adria d.o.o.,
Kolarova 7, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska.
Distributer: Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, Ljubljana,
Republika Slovenija. Proizvođač:
UP INDUSTRIES, Heerener str. 49, 39576
Stendal – Njemačka. Proizvedeno u EU,
DE ST 00217 EG; uvezeno iz Slovenije.
Zastupnik za BiH: Medis International d.o.o.,
Sarajevo, Ahmeta Muratbegovića 2,
71000 Sarajevo, BiH.
Broj rješenja o upisu u Registar RS:
P/18 od 23.04.2020

1514M46E 30145799



MEDIS | www.novalac.hr
www.novalac.ba

1-3 godine

Novalac

3

HR: Napitak na bazi mlijeka s dodanim vitaminima i mineralima namijenjen maloj djeci

BiH: Mlijeko nakon dojenja za malu djecu



400 g e

Hranjiva vrijednost

		100 g	100 ml	%PU*
Energetska vrijednost	kcal	1990	269	
	kJ	474	64	
Masti	g	19	2,6	
- od kojih zasićene masne kiseline	g	7,6	1	
- Linolna kiselina	g	4,4	0,6	
- Alfa-linolenska kiselina	mg	530	72	
Ugljikohidrati	g	64,4	8,7	
- od kojih šećeri	g	38,2	5,2	
Bjelančevine	g	11	1,5	
Soj	g	0,325	0,04	
Vitami				
Vitamin A	µg	540	73	18%
Vitamin D	µg	8,5	1,1	16%
Vitamin E	mg	4	0,5	
Vitamin K	µg	30	4,1	34%
Vitamin C	mg	60	7,1	18%
Tiamin	mg	0,6	0,08	16%
Riboflavin	mg	1	0,14	20%
Niacin	mg	6	0,8	
Vitamin B6	mg	0,7	0,09	
Folna kiselina	µg	120	16	21%
Vitamin B12	µg	2	0,3	38%
Biotin	µg	20	2,7	27%
Pantotenska kiselina	mg	2,5	0,3	
Minerali				
Kalcij	mg	650	88	16%
Fosfor	mg	385	52	
Magnezij	mg	45	6,1	
Željezo	mg	9,5	1,3	16%
Cink	mg	4	0,5	
Bakar	mg	0,35	0,05	
Mangan	mg	0,035	0,005	
Jod	µg	100	14	18%

*PU (preporučeni unos)

Sastojci

Djelomično obrano mlijeko, maltodekstrini, laktoza, biljna ulja (palmino, sojino, kokosovo, ulje uljane repice), fruktoza, dekstroza, trikalcijev citrat, trikalcijev fosfat, vitamini (Askorbinska kiselina (vitamin C), nikotinamid (niacin), DL-α-tokoferol acetat (vitamin E), kalcijev-D-pantotemat, riboflavin, tiamin hidroklorid, retinil acetat (vitamin A), piridoxin hidroklorid (vitamin B6), folna kiselina, D-biotin, fitomenadijon (vitamin K), kolekalciferol (vitamin D), cijanokobalamin (vitamin B12)), etil-vanilin, željezov sulfat, magnezijev oksid, cinkov sulfat, antioksidansi (ekstrakt bogat tokoferolima), bakrov sulfat, kalijev jodid, manganov sulfat.

Uputa za pripremu



PRIJE PRIPREME SVAKOG OBROKA OPERITE RUKU.



1 Očistite bočicu i dudu koju ćete upotrijebiti te sterilizirajte u kipućoj vodi 5 minuta.



2 Vodu za pripremu obroka prokuhajte. Neka ključa bar 5 minuta.



3 Vodu ohladite na 40 ° C i u bočicu ili čašu ulijte 240 ml tople ili hladne vode.



4 Uspite u bočicu ili čašu propisani broj mjerica pomoću priložene mjerice.



5 Zatvorite bočicu za bebe plastičnim poklopcem i dobro promiješajte odnosno promiješajte dok se prašak potpuno ne otopi u vodi.



6 Provjerite temperaturu (37 ° C) na unutarnjoj strani zapešća.

Novalac 3 možete upotrijebiti kao dodatak za pripremu mliječnih obroka.