

Upotreba

Novalac IT je hrana za posebne medicinske potrebe, koja sadrži laktozu kao jedini ugljiko hidrat. Prilagođena je posebnim prehrambenim potrebama dojenčeta sa problemom zatvora od rođenja do 6. mjeseca starosti, koje nije na ishrani majčinim mlijekom. Novalac IT zadovoljava sve prehrambene potrebe dojenčeta do 6. mjeseca starosti, a po savjetu ljekara moguće je nastaviti sa ovom ishranom i nakon 6 mjeseci starosti. U tom slučaju, pripremati obrok po savjetu ljekara, a uobičajen način pripreme jednog obroka podrazumijeva 7 mjerica mlijeka na 210 ml vode.

Nakon 12 mjeseci starosti preporučujemo prelazak na Novalac 3 Junior, mlijeko nakon dojenja, pogodno za ishranu male djece.

Važno upozorenje

Proizvod se mora koristiti pod nadzorom pedijatra. Proizvod je pogodan za upotrebu kao jedini izvor hrane za dojenčad do 6. mjeseca starosti. Nije za parenteralnu primjenu.

Dojenje je najbolji način ishrane za dojenčad do šest mjeseci starosti. Novalac IT se može koristiti samo na osnovu savjeta zdravstvenih radnika nezavisnih od proizvođača hrane, koji se brinu o zdravlju dojenčeta ili majke, a na bazi individualnih posebnih potreba za rast i razvoj dojenčeta. Poseban oprez kod upotrebe Novalaca IT potreban je kod dojenčadi sa oslabljenim imunitetom, nedonoščadi ili novorođenčadi niske porođajne težine kao i kod alergijskih reakcija na bjelanjčevine mlijeka. Nepravilna priprema ili neadekvatno čuvanje mogu predstavljati rizik po zdravlje. Kod hranjenja na bočicu pazite da kontakt između mlijeka i zuba vašeg djeteta ne bude predug ili prečest jer to povećava mogućnost nastanka karijesa. Uvijek operite zube djetetu nakon posljednjeg noćnog obroka.

Doziranje

Starost dojenčeta (mjeseci)	0 do 1	1 do 2	2 do 3	3 do 4	4 do 5	5 do 6
Težina dojenčeta (kg)	4	5	6	6,5	7	7,5
Broj obroka na dan	6 do 7	5	5	5	4	4
Broj mjerica za pripremu jednog obroka	3 do 4	4	4 do 5	6	6 do 7	6 do 7
Količina vode (mL)	90 do 120	120	120 do 150	180	180 do 210	180 do 210

Do vrha napunjena i do ruba poravnana priložena mjerica sadrži 4,3 g Novalaca IT. Jednu mjericu rastopite u 30 ml vode. Dnevnu količinu hrane i broj obroka treba prilagoditi starosti i potrebama dojenčeta. Ako ljekar drugačije ne savjetuje, poštuje preporuke iz tablice.

- Uvijek pripremite svjež obrok.
- Čuvajte na suhom i hladnom mjestu, zaštićenom od svjetlosti.
- Proizvod je najbolje upotrijebiti do datuma utisnutog na dnu limenke.
- Nakon prvog otvaranja limenke sadržaj iskoristite u roku od 3 sedmice.
- Nakon svake upotrebe limenku dobro zatvorite.
- Ne čuvajte nepopijeni obrok. Ostatak bacite.

Serijski broj i rok trajanja su utisnuti na dnu limenke. Pakovano u kontroliranoj atmosferi.

Proizvođač: UP INDUSTRIES, Heerener str. 49, 39576 Stendal – Njemačka.
Proizvedeno u Njemačkoj, DE ST 00217 EG; uvezeno iz Slovenije.
Zastupnik za BiH: Medis International d.o.o., Sarajevo, Ahmeta Muratbegovića 2, Sarajevo, BiH
Uvoznik za BA: **Hercegovinalijek d.o.o.**, Muje Pašića 4, 88000 Mostar, Telefon: 036 501 500.

Broj rješenja o upisu u Registar RS: P/12 od 9.4.2020
Broj i datum rješenja u FBiH: 04-33-3746/20-DP od 23.3.2021

MEDIS | www.novalac.ba



200009538

od 6. mjeseca
rođenja do 6. starosti

Novalac

Hrana za posebne medicinske potrebe
Dijetetski proizvod
Za dijetalnu ishranu dojenčadi sa zatvorom

IT



400 g e

Novalac

Hranljiva vrijednost

	100 g	100 ml	100 kcal	
Energetska vrijednost	kJ	2122,9	276	418,7
	kcal	507	65,9	100
Masti	g	25,5	3,3	5
- od toga zasićene	g	12,4	1,6	2,4
- od toga mononezasićene	g	6,5	0,8	1,3
- od toga polinezasićene	g	5,3	0,7	1
- od toga linolna kiselina (ω-6)	g	4,7	0,6	0,9
- od toga α-linolenska kiselina (ω-3)	mg	460	59,8	90,7
Ugljikohidrati	g	58,2	7,6	11,5
- od toga šećeri	g	58,2	7,6	11,5
Bjelančevine	g	11	1,4	2,2
Sol	g	0,375	0,05	0,07
Vitamini				
A	µg RE	450	58,5	88,8
B1	µg	400	52	78,9
B2	µg	800	104	157,8
B6	µg	300	39	59,2
B12	µg	1,5	0,2	0,3
C	mg	60	7,8	11,8
D3	µg	7,5	1	1,5
E	mg α-TE	12,8	1,7	2,5
K1	µg	30	3,9	5,9
Niacin	mg	4,5	0,6	0,9
Pantotenska kiselina	mg	2,4	0,3	0,5
Folna kiselina	µg	60	7,8	11,8
Biotin	µg	15	2	3
Minerali				
Natrij	mg	150	19,5	29,6
Kalij	mg	450	58,5	88,8
Hlorid	mg	310	40,3	61,1
Kalcij	mg	390	50,7	76,9
Fosfor	mg	200	26	39,4
Magnezij	mg	65	8,5	12,8
Željezo	mg	6	0,8	1,2
Cink	mg	4,5	0,6	0,9
Jod	µg	65	8,5	12,8
Bakar	µg	400	52	78,9
Mangan	µg	35	4,6	6,9
Selen	µg	10	1,3	2
Fluorid	µg	<450	<59	<89
Krom	µg	<50	<7	<10
Molibden	µg	<50	<7	<10
Kolin	mg	100	13	19,7
Inozitol	mg	45	5,9	8,9
Taurin	mg	44	5,7	8,7
L-karnitin	mg	8	1	1,6
Osmolalitet: 124,9 mOsm/L	Ne sadrži alergen. Sadrži mlijeko i soj.			

Osmolaritet: 124,9 mOsm/L

Ne sadrži gluten. Sadrži mliječno i soju.

Sastojci

Obrano mlijeko, mliječne bjelanjčevine, biljna ulja (palmino, sojino, kokosovo), laktoza, kalcijev hlorid, emulgator (sojin lecitin), trikalijev citrat, vitamini (retinilacetat, tiaminijev hidrohlorid, cijanokobalamin, riboflavin, piridoksinijev hidrohlorid, L-askorbinska kiselina, hlekalCIFerol, α-tokoferilacetat, fitomenadion, D-biotin, pteroilmonoglutaminska kiselina, nikotinamid, kalcijev-D-pantotemat), trikalijev citrat, trinatrijev citrat, magnezijev oksid, taurin, željezo sulfat, cinkov sulfat, antioksidanti (tokoferoli), bakrov sulfat, natrijev selenit, L-karnitin, kalijev jodid, inozitol, manganov sulfat, holin bitararat.

Uputstvo za pripremu obroka



PRIJE PRIPREME SVAKOG OBROKA OPERITE RUKE.



1 Bočicu i poklopac sa cuclom prokuhajte u vodi. Neka ključa barem 5 minuta.



2 Vodu za pripremu obroka prokuhajte u pokrivenoj posudi. Neka ključa barem 5 minuta.



3 Vodu u posudi ohladite do 40°C i prelijte je u bočicu.



4 Dodajte u bočicu preporučeni broj mjerica pomoću priložene mjerice.



5 Bočicu zatvorite i dobro promućkajte da se prašak potpuno rastopi.



6 Pripremljeni obrok ohladite do mlakog (37°C) odnosno dok na koži ne osjetite ni hladno ni toplo.